

แบบคัดกรองการเจ็บป่วยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบื้องต้น

ไขเลือดออก



ชั้นอนุบาล 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


โรคไข้เลือดออกในเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี

โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดต่อซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงกี (Dengue virus) อาการของโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดในช่วงแรก จึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าเป็นเพียงโรคไข้หวัด และทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องในทันที โรคไข้เลือดออกมีอาการและความรุนแรงของโรคหลายระดับตั้งแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยไปจนถึงเกิดภาวะช็อกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

ไข้เลือดออก



สำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง
กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า มีอัตราป่วย
107.02 และอัตราป่วยตาย 0.10
ซึ่งหมายความว่า ในประชากรทุก
100,000 คน จะมีผู้ที่ป่วยเป็นไข้
เลือดออกได้ถึง 107.02 คน และมี
ผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 0.1 คน



สาเหตุของโรคไข้เลือดออก

เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ชนิด 1, 2, 3 และ 4 (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4) โดยมียุงลายบ้าน ตัวเมียเป็นพาหะนำโรค กล่าวคือ ยุงลายตัวเมียจะกัดและดูดเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกก่อน (เชื้อไวรัสเดงกีในเลือดของผู้ป่วยจะเข้าไปพักตัวและเพิ่มจำนวนในตัวยุงและเชื้อนี้สามารถมีชีวิตอยู่ในตัวยุงได้ตลอดอายุของยุง คือ ประมาณ 1-2 เดือน) แล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงในรัศมีไม่เกิน 400 เมตร ซึ่งจะเป็นการแพร่เชื้อไปให้คนอื่น ๆ ต่อไป ยุงชนิดนี้เป็นยุงที่ออกหากิน (กัดคน) ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน (เดิมยุงลายนิยมออกหากินในเฉพาะเวลากลางวัน แต่ในระยะหลังพบว่ายุงลายมีการออกหากินในเวลากลางคืนด้วย) และชอบเพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำนิ่งในบริเวณบ้าน เช่น ตุ่มน้ำ โอ่งน้ำ แจกัน จานรองตู้กับข้าว กระจับปี่ ฝากระป๋อง ยางรถยนต์เก่า ๆ หลุมที่มีน้ำขัง เป็นต้น



วิธีป้องกัน

ด้วยเหตุที่ยังไม่มียาป้องกันหรือรักษาโรคไข้เลือดออกนี้ได้ วิธีที่ดีที่สุดคือ การป้องกันการแพร่กระจายของยุงลาย เพื่อลดอัตราการเสี่ยงติดโรคไข้เลือดออก โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

- หาฝาปิดภาชนะเก็บน้ำ เช่น โอ่ง ถังน้ำ ตู้ปลา
- กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พื้นที่ที่มีน้ำขัง เช่น กะลา กะละมัง น้ำในยางล้อรถ บ่อน้ำ
- กรณีในแหล่งน้ำสาธารณะ หรือพื้นที่ที่ต้องการให้มีน้ำ อาจจะเลี้ยงปลาที่กินลูกน้ำเป็นอาหาร เช่น ปลาหางนกยูง หรือใช้สารเคมีเพื่อฆ่าลูกน้ำก็ได้เช่นกัน



แบบคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคไขเลือดออกในเด็ก

ชื่อหน่วยงาน.....วัน/เดือน/ปีที่คัดกรอง.....

ชื่อผู้คัดกรอง.....

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อเด็ก.....นามสกุล.....ชั้น.....

2.เกิดวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อายุ.....ปี.....เดือน.....

3.น้ำหนัก.....ส่วนสูง.....

4.เพศ

1. ☐ ชาย 2. ☐ หญิง

5.ผู้ให้สัมภาษณ์

1.แม่ 2.พ่อ

3.ผู้ที่เลี้ยงดูเด็กประจำ(ระบุ.....)

6.สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา

1. โสด 2. คู่

3.หม้าย / หย่า 4. แยกกันอยู่/ร้าง

7. การศึกษาของมารดา

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. ไม่ได้เรียน | 2. ประถมศึกษา |
| 3. มัธยมศึกษา | 4. อื่นๆ(ระบุ)..... |

8. การศึกษาของบิดา

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. ไม่ได้เรียน | 2. ประถมศึกษา |
| 3. มัธยมศึกษา | 4. อื่นๆ(ระบุ)..... |

9. อาชีพของบิดา

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 2. รับจ้างทั่วไป |
| 3. ค้าขาย | 4. อื่นๆ(ระบุ)..... |

10. อาชีพของมารดา

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 2. รับจ้างทั่วไป |
| 3. ค้าขาย | 4. อื่นๆ(ระบุ)..... |

แบบคัดกรองโรคไข้เลือดออก

ส่วนที่ 2 คำชี้แจง

จงขีดเครื่องหมาย / ลงในช่อง มี หรือ ไม่มี ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น

อาการ	มี	ไม่มี
1.ไข้/ไข้สูงเฉียบพลัน 39-40 องศา ประมาณ 2-7 วัน		
2.ปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามตัว		
3.ปวดกระบอกตา		
4.ปวดกล้ามเนื้อ		
5.ผื่นแดง		
6.มีอาการเลือดออกตามผิวหนัง		
7.ปวดท้อง ถ่ายดำ และอาเจียน		
8.ปวดกระดูกหรือปวดข้อ		
9.ซึมอ่อนเพลียและเบื่ออาหาร		
10.มือเท้าเย็นรอบปากเขียว		
คะแนนรวม		

หมายเหตุ คะแนนรวม หมายถึง รวมคะแนนของช่อง ไม่มี คิดข้อละ 1 คะแนน
ถ้าได้ 5 คะแนน ขึ้นไปแสดงว่าไม่มีความเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออก



สมาชิกในกลุ่มที่4

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1.นางสาวสายด๊ะ มะปี่แย๊ะ | รหัส 017 |
| 2. นางสาวโนรา แวสมะแอแอ | รหัส 025 |
| 3. นางรุสนา จะมาจี | รหัส 026 |
| 4. นางสาวนาปีสาร์ บอสู | รหัส 028 |
| 5. นางสาวซูรีณา มะ | รหัส 031 |
| 6. นางสาวสารีณา ยะโกะ | รหัส 033 |
| 7. นางนุรไอนิง อาแว | รหัส 034 |

